Ситуация о количестве обращений по поводу присасывания клещей на территории Республики Беларусь по состоянию на 01.11.2018 года

По данным энтомологического мониторинга за 10 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в Республике Беларусь количество обращений населения в организации здравоохранения по поводу присасывания клещей сократилось на 18%. Наибольшее количество покусов в текущем году отмечалось с мая по июль месяц, максимальное количество пострадавших отмечалось в июле месяце.

По результатам энтомологического слежения за истекший период текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, численность клещей в природных биотопах сократилась на 2%, на антропогенных территориях − на 6%, что свидетельствует об эффективности проведенных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе акарицидных обработок.

Основной мерой профилактики заболеваний клещевыми инфекциями является защита от присасываний клеща, а в случае если клещ все же присосался – своевременное проведение профилактического лечения, назначенного при обращении за медицинской помощью. Профилактическое лечение позволяет предупредить не только болезнь Лайма, но и другие бактериальные клещевые инфекции. Максимальный эффект антибиотикопрофилактики достигается только в том случае, если прием препарата начат в первые 72 часа после укуса клеща.

Активность клещей по многолетним наблюдениям в природе прекращается (уходят в «зимнюю спячку») при установлении отрицательных температур атмосферного воздуха и устойчивого снежного покрова.

Наибольшему риску стать жертвой клеща в осенний период подвергаются дачники и любители сбора грибов.

Учитывая продолжение сезона активности клещей, напоминаем жителям Республики Беларусь на необходимость соблюдения правил профилактики при посещении лесных и лесопарковых зон, которые размещены на сайте ГУ «РЦГЭиОЗ» ранее.

11-01/Яшкова