

## Сравнительная характеристика Тиковак и Клещ-Э-Вак

Показатель	Тиковак, Тиковак Джуниор	Клещ-Э-Вак
<b>Возрастные ограничения</b>	Тиковак Джуниор: с 1 года до 15 лет; Тиковак: от 16 лет и старше	Клещ-Э-Вак 0,25 мл: от 1 года до 16 лет; Клещ-Э-Вак 0,5 мл: от 16 лет и старше;
<b>Тип вируса клещевого энцефалита, против которого вакцина обеспечит защиту</b>	Статистически эквивалентные титры антител к типам КВЭ: 1. Европейскому 2. Сибирскому 3. Дальневосточному	Иммунитет против КВЭ:  1. Дальневосточный тип
<b>Эффективность вакцинации</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• После первых 2-х доз ожидается достаточная защита (до 89,3%) для текущего сезона клещей.</li> <li>• После первых 3-х доз ожидается стойкий иммунитет до 99% у лиц 1-60 лет и до 96% у лиц старше 60 лет.</li> </ul>	Не отмечено в инструкции
<b>Противопоказания</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ;</li> <li>2. Тяжелая гиперчувствительность к яичному и куриному белкам;</li> <li>3. Умеренно-тяжелые или тяжелые острые заболевания (с лихорадкой или без нее).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения;</li> <li>2. Тяжелые аллергические реакции;</li> <li>3. Бронхиальная астма;</li> <li>4. Аутоимунные заболевания;</li> <li>5. Тяжелая реакция после введения вакцины (повышение <math>t^{\circ}</math> выше <math>40^{\circ}\text{C}</math>; в месте введения – отек, гиперемия более 8 см в диаметре), или осложнения на предыдущую дозу вакцины.</li> </ol>
<b>Срок годности</b>	30 месяцев	24 месяца
<b>Производитель</b>	Технология и разработка: «Пфайзер Инк.» (США); Завод-изготовитель: «Бакстер АГ» (Австрия)	Технология и производство: «ФГБНУ ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Россия)